

## Inicio del esquema secuencial de Vacunación Antipoliomielítica y cambio de Sabin Oral trivalente (tOPV) a Sabin Oral bivalente (bOPV)

En enero del 2013, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el Plan Estratégico para la erradicación de la Poliomiélitis y Fase Final 2013 – 2018, que recomienda el retiro de todas las vacunas orales contra la poliomiélitis para el año 2018, **iniciando a partir del año 2016, el retiro del componente 2 de la vacuna.**

A partir de esta iniciativa, en nuestro país, el día 30 de abril del 2016, la vacuna Sabin oral trivalente (tOPV), utilizada para la prevención de la poliomiélitis, **será reemplazada por una formulación bivalente (bOPV) con los serotipos: 1 y 3.**

De tal forma, los niños menores de un año que inicien su vacunación antipoliomielítica recibirán un esquema secuencial que incluirá en **las primeras dos dosis Vacuna Salk inactivada (IPV) (con los 3 tipos de poliovirus), y en las dosis subsiguientes Vacuna Sabin bivalente (Bopv).**

Los pasos que se seguirán en Argentina son:

- La vacuna Sabin tOPV se utilizará **hasta el viernes 29 de abril de 2016 inclusive**, terminada la jornada laboral todas las dosis remanentes, serán retiradas de la cadena de frío.
- Todas estas vacunas tOPV, serán colocadas en descartador de uso exclusivo para su posterior destrucción.
- Se hace necesario completar el **Formulario de Destrucción** que será provisto por la **Dirección Nacional de Inmunizaciones (DINACEI)**, a través del **PAI correspondiente**. Este formulario será exclusivo para esta vacuna.
- A partir del día Sábado 30 de Abril, todos los niños que comiencen su esquema de vacunación de rutina antipoliomielítica y que sean menores de 12 meses, lo harán con el esquema secuencial de 2 dosis (2 y 4 meses) de **vacuna antipoliomielítica inactivada IPV**, completando el esquema, según calendario, con 3 dosis de bOPV.
- A partir del Sábado 30 de Abril, todo niño que hubiera comenzado su vacunación con tOPV Sabin, completará el esquema con bOPV.


- En los niños mayores de 12 meses sólo se utilizará la bOPV (esquemas atrasados).

### Nuevo esquema secuencial de vacunación antipoliomielítica:

Edad	Vacuna
Lactantes de 2 meses*	1º dosis con vacuna IPV
Lactantes de 4 meses*	2º dosis con vacuna IPV
Lactantes de 6 meses	3ª dosis con Vacuna bOPV
Niños y niñas de 15-18 meses	1er refuerzo con vacuna bOPV
Niños y Niñas de 5-6 años	2do refuerzo con vacuna bOPV

\*Se utilizará vacuna IPV únicamente en niños que inicien esquema hasta los 11 meses y 29 días de edad. Aquellos lactantes que hubieran comenzado su esquema de vacunación con vacuna tOPV, deberán completar su esquema con vacuna oral (bOPV).

## Switch o Cambio de tOPV a bOPV



## 29 de Abril del 2016

